



安心なノンアルコールミストで快適除菌

ウイルス・菌・ニオイ・花粉対策に大切なひとのために清潔空間を


除菌・消臭に活躍する成分は、次亜塩素酸 (HClO) です！
ZiACOはその次亜塩素酸 (HClO)が100%存在するように設計されています。

消臭効果

約90分で
消臭強度
2.0に低減

臭気強度

5：強烈なおい
4：強いにおい
3：案に感知できるにおい
2：何のにおいかわかる弱いにおい
1：やっと感知できるにおい
0：無臭



試験機関：暮らしの科学研究所株式会社 超音波ミストHM-201w【強】で実施。
約14畳の試験空間でペット臭(ペットのトイレで再現)に対する消臭効果を
臭気強度表示法によりパネル6名(内、臭気判定士1名で実施)で試験。※使用環境などの条件により効果は異なります。

ZiACO (ジアコ) について

【主成分】次亜塩素酸

【原料】次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ガス、RO 膜処理水 (次亜塩素酸ナトリウムを炭酸ガスでpH 調整しております)

【有効塩素濃度】50~70 mg/L (ppm) (製造時は約70 mg/L (ppm)) 【液性】弱酸性~中性 (pH 5~7)

【使用期限】製造後約6 か月 (製造日は製品に記載) *その他、使用方法及び使用上の注意は、製品の表示をご確認ください。

安全性に関する試験結果

試験内容	試験機関	試験概要	結果
肝機能への影響	横浜薬科大学総合健康メディカルセンター	有効塩素濃度50~500 mg/L (通常濃度50mg/L) の次亜塩素酸水溶液 (次亜塩素酸ナトリウム溶液を炭酸ガスで弱酸性~中性にした溶液) をマウスに経口投与し、血清GOT値・GPT値の測定ならびに肝切片の病態学的影響を調べた。	急性投与及び連続投与いずれも肝臓への影響はなし。
皮膚刺激性試験	株式会社ボゾリサーチセンター	ZiACO (ジアコ) をウサギの健常及び損傷皮膚に半閉鎖投与し、72時間経過観察した。	皮膚刺激性・腐食性なし。
眼刺激性試験	株式会社ボゾリサーチセンター	株式会社ボゾリサーチセンター ZiACO (ジアコ) をウサギの眼に投与し、72時間経過観察した。	眼刺激性・腐食性なし。
単回経口投与毒性試験	株式会社ボゾリサーチセンター	ZiACO (ジアコ) をラットに経口投与し、14日間観察した。	剖検において、肉眼的異常は認められず、雌雄ともに順調な体重増加が認められた。
塩素ガス濃度測定	クリタ分析センター株式会社	空調を停止した室内でミスト(噴霧器)を運転し、空気中に含まれる塩素ガス濃度を測定した。	ミスト (噴霧器) 傍で0.05ppm未満であることを確認した。

安全性試験

- (1) 肝機能への影響 試験機関：横浜薬科大学 総合健康メディカルセンター
- (2) 皮膚刺激性試験 試験機関：株式会社ボゾリサーチセンター
- (3) 眼刺激性試験 試験機関：株式会社ボゾリサーチセンター
- (4) 単回経口投与毒性試験 試験機関：株式会社ボゾリサーチセンター
- (5) 塩素ガス濃度測定 試験機関：クリタ分析センター株式会社

承認番号 200903-0510

有効性試験

- (1) 浮遊ウイルス抑制試験 試験機関：一般財団法人北里環境科学センター
- (2) 付着ウイルス抑制試験 試験機関：一般財団法人北里環境科学センター
- (3) ノロウイルス不活化試験 試験機関：一般財団法人北里環境科学センター

※詳しくはZiACO (ジアコ) 公式HP及び、クリクラ新屋HPをご覧ください。